GENGIGEL®

(Acide hyaluronique)

Rétablit la santé des gencives et apaise les tissus buccaux enflammés et traumatisés

GENGIGEL® est un dispositif médical contenant de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire (sous forme de hyaluronate de sodium), obtenu par un procédé biotechnologique garantissant un haut niveau de pureté.
Sa formulation est spécialement conçue pour ressembler à l'acide hyaluronique physiologique présent dans la muqueuse gingivale normale.

Propriétés: L'acide hyaluronique est une substance “naturelle”, un constituant physiologique du tissu conjonctif (particulièrement dans la muqueuse gingivale) où il a une action antiœdémateuse et réparatrice sur les tissus, résultant de son effet macro-aggrégant. Cela explique ses propriétés anti-inflammatoires. Dans les conditions normales, l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire est distribué de manière sélective, spécifique, et est particulièrement concentré dans les couches superficielles de l'épithélium gingival, ou il contribue à la fonction de barrière, et à la résistance à la traction du ligament alvéolo-dentaire.
Dans les maladies parodontales (états inflammatoires, poches gingivales, plaies), les besoins tissulaires augmentent considérablement (jusqu'à environ 200% par rapport aux valeurs de base) ce qui démontre son rôle spécifique dans la régulation du renouvellement cellulaire et dans l'optimisation des capacités de régénération locale.
La déficience en acide hyaluronique survenant dans ces conditions empêche les tissus de:

- rétablir l'équilibre hydrique (par conséquent l'augmentation de l'œdème et la douleur);
- activer la migration des fibrocytes responsables de la réparation tissulaire (la cicatrisation est donc retardée).

Par conséquent, un tel déficit devient par lui-même responsable de la persistance de l'état inflammatoire.
Les études sur l'homme montrent une similitude de la disponibilité des acides hyaluroniques exogènes et endogènes, qui permet de rompre cette situation.

GENGIGEL® est donc un produit innovant qui a une action prolongée sur l'équilibre des liquides tissulaires et qui accélère la cicatrisation et la réparation du desmodonte (ligament alvéolodentaire), en prévenant le déficit en acide hyaluronique naturel et en renforçant ses effets. Il n'est pas adsorbé par la muqueuse, et n'induit aucun effet délétère pharmacologique local ou systémique.
L'acide hyaluronique est dépolymérisée extensivement et réduit à ses sous-unités de base dont il est composé, sous l'action enzymatique de la plaque bactérienne.

GENGIGEL®, par une adhésion maximale, permet à l'acide hyaluronique (qui serait sinon éliminé par le drainage salivaire permanent) d'être maintenu in situ.

GENGIGEL® est extrêmement sûr; il ne présente ni contre-indications ni effets indésirables; il peut être utilisé sans restriction même par les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées.
Sa sûreté le rend particulièrement utile quand les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. En raison des propriétés du Xylitol, un édulcorant naturel non cariogène et n'induisant pas de variations significatives de la glycémie, le produit convient aussi aux diabétiques. Il ne présente aucune interaction médicamenteuse, et peut donc être aussi utilisé sans danger durant des thérapeutiques spécifiques, notamment les antibiotiques.

Indications: états inflammatoires (gingivites, saignements, récessions gingivales, poches gingivales), états traumatiques (en particulier aphtes, plaies provoquées par des prothèses amovibles ou des appareils orthodontiques, ou par nettoyage, abrasion, extractions dentaires, séquelles post-chirurgicales) ou états où la muqueuse gingivale requiert une augmentation des concentrations en acide hyaluronique.

Mode d'emploi: Après une hygiène buccale correcte, appliquer trois à cinq fois par jour (après les principaux repas) pendant 3-4 semaines, jusqu'à disparition complète des symptômes.

Gel: appliquer un film de gel sur le tissu gingival, en massant doucement avec les doigts afin de faciliter la distribution correcte sur la surface de la muqueuse.
Spray: chaque pulvérisation garantit une distribution homogène et constante du liquide sur la surface buccale. 1 à 2 pulvérisations sur les tissus enflammés ou traumatisés. Maintenir le flacon en position verticale.

Mises en garde: hypersensibilité individuelle avérée aux composants de la formulation. Si les symptômes persistent, consulter votre dentiste traitant.
Conserver à une température de (5°C - 40°C).

Conditionnement:
GENGIGEL® Gel Tube de 20 ml
GENGIGEL® Spray Flacon de 50 ml